Votre santé et votre sécurité... notre priorité.

Santé Canada Health Canada

Blattes

Feuillet de renseignements sur les organismes nuisibles



Photos, courtoisie de : Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org; Forest and Kim Starr, United States Geological Survey, Bugwood.org



Photos : Clemson University, USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org

Les blattes – À quoi ressemblent-elles?

Les blattes (aussi appelées coquerelles, cafards et cancrelats) sont des insectes nuisibles depuis environ quatre millions d'années. Il en existe plus de 3 500 espèces dans le monde, notamment la blatte à bandes brunes, la blatte orientale, la blatte américaine, la blatte fuligineuse, la blatte des bois et la blatte germanique.

La blatte germanique est l'une des espèces les plus communes dans les résidences du monde entier. Elle aime particulièrement habiter les restaurants, les installations de transformation des aliments, les chambres d'hôtels et les maisons de soins infirmiers. Bien qu'elle ne soit pas très tolérante au froid, cette blatte est présente dans les immeubles jusque dans le Grand Nord (Alert et Nunavut). Elle mesure entre 1,3 et 1,6 cm (½ à 5/8 po) et elle est de couleur havane à brun pâle avec deux lignes foncées parallèles qui partent de la tête et se terminent à la base des ailes. Les blattes ont des ailes, mais elles sont incapables de voler.

Les blattes occupent tout endroit où elles ont accès à de la nourriture, à de l'eau et à un abri. Elles sont attirées par les immeubles en raison des conditions chaudes et humides offertes par les cuisines, les salles de bains, les sous-sols et les installations de plomberie. Leur présence ne signifie pas nécessairement qu'un lieu est insalubre. Les blattes et leurs œufs peuvent entrer dans une résidence sur divers objets comme de vieux meubles, des denrées alimentaires, des bouteilles de bière et de boissons gazeuses vides de même que des boîtes servant au transport. Une fois à l'intérieur d'un immeuble, les blattes s'y déplacent facilement. Étant donné que les blattes sont les plus actives la nuit, elles peuvent ne pas être détectées avant un certain temps. Les blattes aiment les aliments qui contiennent de l'amidon, des sucres et des protéines, mais elles peuvent manger n'importe quoi lorsqu'elles sont affamées.

Quels dommages peuvent-elles causer?

Les blattes causent rarement des dommages aux structures. Elles peuvent toutefois contaminer les aliments et transmettre des maladies après avoir été en contact avec des poubelles ou des égouts en marchant et en laissant des excréments sur les aliments ou dans les aires de préparation des aliments. Les personnes atteintes d'asthme peuvent avoir des réactions indésirables lors d'un contact avec des excréments ou des parties de blattes.

Comment peut-on lutter contre ces insectes?

Pour se débarrasser des blattes, le respect de mesures d'hygiène intensives conjointement avec l'utilisation de pesticides est nécessaire. N'utiliser que des pesticides ne sera pas efficace, car on doit d'abord modifier le milieu physique.

Hygiène

La prévention contre une infestation d'organismes nuisibles commence par garder la maison propre afin de leur couper l'accès aux sources de nourriture, d'eau et d'abri.

- Nettoyer les dégâts immédiatement. Ne pas laisser d'eau et de nourriture pour les animaux de compagnie accessible toute la journée.
- Garder les aliments dans des contenants étanches en plastique ou en verre, plutôt que dans du papier ou du carton que les blattes mâcheraient et y pondraient des œufs.
- Nettoyer régulièrement les endroits sombres ou humides près d'une source d'aliments, par exemple les débris sous et derrière les électroménagers, la graisse accumulée derrière la cuisinière et le réfrigérateur.
- Ranger les ordures dans des contenants en plastique étanches et s'en débarrasser tous les jours.

Garder les aliments dans des contenants étanches en plastique ou en verre.

Utilisation responsable des pesticides

Avant d'acheter un pesticide

- Identifiez l'organisme nuisible correctement.
- Utilisez d'abord des mesures de lutte physique et des moyens autres que les pesticides.
- Lisez le mode d'emploi et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette du produit avant de l'acheter. L'étiquette doit comporter le nom de l'organisme nuisible à combattre et l'endroit où le produit peut être utilisé (par exemple à l'intérieur, à l'extérieur, dans le jardin, sur les animaux de compagnie).
- N'achetez que la quantité de produit requise pour le traitement.
- Vous pouvez toujours choisir de faire appel aux services d'un professionnel au lieu de faire le traitement vous-même.

Lors de l'utilisation d'un pesticide

- Lisez attentivement le mode d'emploi et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette.
- Ne fumez pas et ne consommez pas de boissons ou de nourriture pendant l'application d'un pesticide.
- Faites sortir les enfants et les animaux de compagnie des lieux ou éloignez-les pendant le traitement. Couvrir ou enlever les aquariums.
- Couvrez ou enlevez les aliments, les ustensiles et la vaisselle si le traitement se fait dans la cuisine.

DTP-Cockroaches-Fra.indd 1 16/03/2010 11:50:31 AM

- Ne pas laisser la vaisselle sale s'accumuler, particulièrement durant la nuit. Si on ne peut la laver immédiatement, la faire tremper dans de l'eau savonneuse.
- Passer l'aspirateur régulièrement pour enlever les débris d'aliments et les œufs d'insectes.
- Emballer ou isoler les tuyaux sur lesquels il y a condensation, réparer les robinets et les tuyaux qui fuient, ventiler les salles de bains et déshumidifier les endroits humides afin de réduire les sources d'eau.

Nettoyage à la vapeur, à l'aspirateur et congélation

Si on suspecte que des meubles, des jouets ou des objets d'artisanat contiennent des blattes, les nettoyer à la vapeur si le matériau ne sera pas endommagé par l'humidité et la chaleur. Passer régulièrement l'aspirateur permet d'enlever des sources de nourriture, des blattes et leurs œufs. S'assurer de tuer toutes les blattes en immergeant le sac de l'aspirateur dans de l'eau savonneuse On peut également congeler les articles infestés de 24 heures à une semaine à -8 °C (17,6 °F).

On peut fabriquer un piège soi-même.

Pièges

Les pièges, notamment les pièges collantes, permettent de surveiller les populations de blattes et de connaître les endroits où elles se cachent afin de mieux concentrer vos efforts de lutte. On peut acheter des pièges à blattes ou les faire soi-même facilement. Étendre de la vaseline sur la paroi intérieure d'un petit pot de couleur foncée et installer du ruban double-face à l'extérieur du contenant pour permettre à la blatte de grimper. Placer un petit morceau d'aliment, comme du pain, dans le pot. Une fois qu'une blatte aura grimpé dans le contenant, elle ne pourra en sortir. On peut tuer les blattes piégées dans un seau rempli d'eau savonneuse ou en mettant un couvercle sur le pot et en plaçant celui-ci dans le congélateur pendant au moins 24 heures.

Scellage des cachettes et des points d'entrée

Sceller et calfeutrer toutes les fissures, les crevasses et les ouvertures autour des tuyaux pour réduire le nombre de cachettes pour les blattes. Installer un morceau de filet à moustiquaire ayant des mailles serrées sur les fissures, les crevasses, les évents, les tuyaux ouverts et les drains pour restreindre leurs accès à la résidence. Entreposer les ordures dans des contenants en métal ou en plastique épais avec des couvercles étanches et s'en débarrasser régulièrement. Entreposer les aliments dans des contenants en plastique épais ou en verre.

Produits

Blatte dans une crevasse
Photo : Department of Entomology, University of Nebraska-Lincoln

Il existe divers pesticides pour lutter contre les blattes qui peuvent contenir de la resméthrine, de la d-trans alléthrine, du butoxyde de pipéronyle ou du propoxur. Dans le cas d'une grave infestation, la pyréthrine en aérosol ou en pulvérisation généralisée peut accroître l'efficacité du traitement en les affaiblissant et en les évacuant des surfaces traitées.

Les pesticides homologués les plus couramment utilisés pour lutter contre les blattes sont les traitements résiduels à installer dans les fissures et les crevasses.

Les pièges à appâts contenant la matière active abamectine sont offerts dans des contenants sécuritaires. Ils permettent de piéger les insectes et de les tuer entre 48 et 96 heures après l'ingestion de la matière active. On peut également utiliser des pièges à appâts qui contiennent du chlorpyrifos dans les zones résidentielles.

La terre de diatomées n'est pas toxique pour les humains ni pour les animaux de compagnie.

Les propriétaires peuvent acheter des produits à base d'acide borique sous forme de gel ou de poudre. Quant à eux, les spécialistes de la lutte antiparasitaire peuvent utiliser de l'acide borique sous forme de pâte pour traiter les fissures et les crevasses. Les insectes ingèrent l'acide borique lorsqu'ils font leur toilette.

La terre de diatomées, une fine poudre aussi appelée silice, est formée de squelettes broyés de microorganismes marins fossilisés. Elle n'est pas toxique pour les humains ni pour les animaux de compagnie. Cette poudre restera active tant qu'elle sera sèche. Lorsque des insectes rampent sur cette poudre, ils égratignent leur cuticule (peau), ce qui les déshydratent et les tuent. Les utilisateurs doivent éviter d'inhaler la poudre lorsqu'ils appliquent le produit.

Des pesticides combinant la pyréthrine et l'aérogel de silice sont également offerts pour lutter contre les blattes. La pyréthrine affaiblit rapidement les blattes alors que l'aérogel de silice fonctionne comme la terre de diatomées, c'est-à-dire qu'il les déshydratent lentement pour finalement les tuer.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2010
SC Pub : 091051
ISBN : 978-1-100-94143-1
Numéro de catalogue : H113-1/6-2010F

Photos : Clemson University, USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org

Santé Canada
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 1-800-267-6315
De l'extérieur du Canada : 613-736-3799 (frais d'interurbain)
Télécopieur : 613-736-3798
www.santecanada.gc.ca/arla

Après avoir utilisé un pesticide

- Lavez-vous toujours les mains soigneusement après avoir manipulé un pesticide.
- Ne laisser pas des personnes ni des animaux de compagnie entrer en contact avec les surfaces traitées avant qu'elles ne soient complètement sèches.
- Ventilez bien les lieux traités.
- Nettoyez toutes les surfaces ayant un contact direct avec les aliments, comme le dessus des comptoirs de cuisine, des tables et des cuisinières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Gardez toujours les pesticides hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie et loin des aliments et des boissons.

En cas d'empoisonnement

- Communiquez immédiatement avec un centre antipoison et consultez un médecin.
- Apportez le contenant ou l'étiquette du produit à l'urgence ou chez le médecin.
- Suivez les directives de premiers soins qui figurent sur l'étiquette.
- En cas d'empoisonnement d'un animal de compagnie, consultez un vétérinaire immédiatement.
- Déclarez tout incident relatif à un pesticide à son fabricant (numéro de téléphone sur l'étiquette). Le fabricant est obligé de le déclarer à son tour à Santé Canada.

Élimination des pesticides

- Ne réutilisez pas les contenants de pesticides. Enveloppez-les et jetez-les avec les ordures ménagères.
- Suivez le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette ou communiquez avec les autorités provinciales pour l'élimination des pesticides.

Note : Les précautions énumérées ci-dessus sont d'ordre général. Lisez toujours l'étiquette pour plus de précisions. En cas de doute, consultez un expert.

Santé Canada
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
www.santecanada.gc.ca/arla
1-800-267-6315

DTP-Cockroaches-Fra.indd 2 16/03/2010 11:50:36 AM